DISSERTATIO

INAUGURALIS MEDICO - CHIRURGICA,

SISTENS

MORBOS IN VALETUDINARIO BROMBERGAE CASTRENSI OBSERVATOS NOTABILIORES.

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE

GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS

IN

UNIVERSITATE LITERARIA GRYPHIENSI

PRO SUMMIS

MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS

RITE OBTINENDIS

1832

DIE MENS. JUL. A. MDCCCXXXII

H. L. Q. S.

1832

PUBLICE DEFENSURUS EST

AUCTOR

LEOPOLDUS C. L. ROSE

SUSATO - GUESTPHALUS.

OPPONENTIBUS:

BERGER, MEDIC. ET CHIRURG. DR.
GOMBAULT, MEDIC. ET CHIRURG. CAND.
DOLLE, MEDIC. ET CHIRURG. CAND.

GRYPHIAE

TYPIS FRID. GUIL. KUNIKE, REG. UNIVERS. TYPOGR.

VIRO ILLUSTRISSIMO

F U N K I O

MEDIC. AC CHIR. DOCTORI

-IONIS NONAE MILITUM PEDESTRIUM MEDIC.

SUPREMO

FAUTORI MULTUM DE SE MERITO

NEC NON

OPTIMO CARISSIMOQUE

PATRI

ARCHIGYMNASII SUSATENSIS SUBRECTORI AC PRAECEPTORI SUPERIORI

HAS STUDIORUM PRIMITIAS

CONSECRAT

AUCTOR.

ım omnes fere inaugurales quidem differ-
ones, aut morbi alicujus monographiae,
ıerofis praeclarorum in re medica citationi-
virorum inftructae, quin imo iconibus or-
ıe fint, aut compilationes e virorum medi-
ım, omnium temporum et fcholarum, ope-
ıs confcriptae; multum mecum penfitavi dif-
ıtionem confcripturus, quamnam rem mihi
tandam eligerem, cum nec opera artis
rae heroum mihi praefto effent, nec tempus
c omnia evolvendi ac relegendi. Morbo-
igitur infigniorum, quos Brombergae ob-
avi, quaque hi curabantur rationis brevem
mbrationem benigno animo exceptum iri
idi.

Priusquam autem rem ipfam ineam, quae-
ıes quasdam praemittere conceffum fit, quae
ni momenti mihi vifae, ut de praeftatis et
ftandis rebus recte judicetur.

Primo, quonam animo inftructi fuerint
tes.

Tum, quaenam fubfidia valetudinario fuppe-
ta fuerint, refpectu regionis, domiciliorum
lminiftrationis medicae ac oeconomicae.

Quod ad primam attinet quaeftionem, mul-
valet in militum animum ac corpus, quies

pacis in tumultus praeliorum conversa. Spe
ctoriarum reportandarum hilares reddit mi
longinqua itinera et castra stativa relaxant
mum tristitiaque implent, magna praelia
mum elatum reddunt ac intendunt, timor
destini et repentini hostium adventus deprim

Nostri autem milites audiebant de pra
et victoriis cum patriae terminos observa
aut longinqua itinera facerent. Hostes ape
armis aggredi cupiebant, at inimicum clam
bitoque advenientem, quem nec videre, nec
mis capere, nec interficere possent a patria
mitibus arcere jussi erant. Brevi, omnes m
tes spes fefellit et tristitia impleti et depr
sunt.

Quoad secundam quaestionem, valetu
narium Brombergae castrense, quod ex re
horreo farinario, in tabulato superiori et in
riori centum et septuaginta aegrotos capie
ex nosocomio militari stationario, aedificio
cubitorio, coenaculo monasterii et aedificio
vectigal viarium exigendum, constitit, omni
auxiliis satis instructum erat. Huic valetudi
rio medicus superior cum tribus chirur
praeerat.

Cholera indica vero carrepti, extem
ad nosodochium pro aegrotis Cholera indi
laborantibus translati sunt.

A primo mensis Augusti ad ultimum men
Novemb. diem mille et ducenti aegroti in h
valetudinarium recepti sunt, quorum trigin
quatuor mortui.

Typhus abdominalis.

Periculosus hic et subdolus morbus cla

tina ſua tardaque, qua oriretur ratione, ae-
timendus erat, ac vehementia et rapiditate,
decurreret. Prodromi et initia morbi ple-
ıque animadverſionem medici effugiunt, quod
ſecundaria morbi origine poſitum videtur.
rbus enim primarius vitium vegetationis
icae inteſtinorum, ei ſimile videtur, quod
ıendis pulmonum tuberculis ſubeſt. Primi
que ſtadii phthiſeos pulmonalis ſympto-
a tam levia ac mitia ſunt, ut aegrotus
tum abſit, ut ſe aegrotantem ſuſpicetur.
tationes, congeſtiones, debilitas tunicae in-
nalis internae et dyſcraſiae variae, haec con-
nenta gignere poſſe videntur. Imo ſecun-
ı ſtadium aut ulcerationis, initio quidem,
us aegroto quam medico timoris incutit.

Symptomata, quae equidem obſervare po-
im, breviter deſcribam. Febris mitis, ves-
ino tantum tempore, adeſt. Diarrhoea ſe-
-bilioſa, modica, appetentia ciborum mi-
, ſitis aucta, lingua muco e viridi albo
a, apex autem marginesque ſaepius rubri,
rvabantur. Dolores paene nunquam, ſi
tis dolores leves ac gravitatem excipias,
oti accuſabant. Cum autem diligentius ab-
en digitis tangentibus perſcrutareris, aliquo
ue loco, praeſertim in regione inguinali
tra, aegrotus dolorem obtuſum perſentie-
— Hoc ſtadium modo brevius, modo lon-
tempus perdurabat; cum brevius, celeri-
vires dejectas, functiones ſenſuum laeſas ac
em continuam continentem, obſervavi. Ae-
i, initio quidem, ſuae mentis erant, ſed
aut plane nihil audiebant, ſitique ma-
ore ſicco vexati, delirabant, balbutiebant,

obmurmurabant, artus tremebant tendine subsiliebant.

Facies lurida, genae rubrae vel cer vultus pavidus, anxius et attonitus, or alienatus videbatur. Abdomen efflatum, cipiente nunc tertio stadio, collabebatur; arrhoea colliquativa celerrime vires cons bat; deliria cedebant sopori, oculi late semioccluſi, ceruleis circulis circumdati e

Pulsus frequens, debilis, parvus, inae lis, functionum sensuum deletio. Cum abdomen viscidum gravius quoque impri res, vix motus convulſivus vultus animad poterat. Sedes involuntariae, foetidae, stremo paralysis, mortem adducebant. Stad quidem secundum quatuor vel quinque perdurare, tertium vero secundo vel tertio morte finiri solebat. — Cum morbus m chronice decurreret, signa febris biliosoſtricae, secundum stadium significabant. D res capitis obtusi, febris exacerbatio vespe na, alvi exonerationes biliosae, lingua m luteo tecta, abdomen efflatum, morositas tristitia observabantur; ciborum appeter decrescebat, sitis augebatur. Febris remis nibus, typo continuo-continente, suppre labia oris et lingua exsiccari incipiebant; quintum circiter diem, vultus aliquid insol melancholici ostendebat. De paraudia gr aegrotum quemdamradeo iratum vidi, ut ipse aures pulsaret. Post nonum circiter duodecimum diem deliria blanda et noc insomnes videbantur. Crescentibus signis o nibus, post quatuordecim dies plerumque, t tium stadium incipere solebat.

Prognofis in ftadio fecundo dubia, in ter-
peffima tantum ftatuenda erat.

Therapia. Cum typhi abdomnalis indoles
ıdomorphofis, e cohibita egeftione et tur-
reproductiva vita tunicae inteftinorum in-
ae, quae ferius, ocius in ulcerationem
, deducenda videatur, nec antiphlogiftica
emulcentia, nec adftringentia, nec tonica
nervina, fic dicta, remedia, auxilium prae-
ıra fint, fed ea, quae vitam reproducti-
, inhibitam egeftionem, vel abfolute de-
ate, vel relative affluxo humorum aucto,
ubinflammatione, effectam, commutent de-
taque concrementa folvant phlogofinque ul-
tivam cohibant. Optimo igitur fucceffu.
melas, magnis dofibus, ad dimidium vel
grum fcrupulum, femel vel bis unoquoque
dabatur, donec diarrhoea perfiftebat et
ıa humida fiebat. Febris nunc decrefcebat,
ria fomno cedebant. Diutius autem virium
ctioni remanenti valeriana, Floribus arni-
liquor. amm. fuccin., vino, fub finem
a et fpirituofis lavationibus, occurreba-
Cum paraudia tremorque artuum, cutis
, afpera, perfeverarent, fuperfufiones fri-
e in balneo tepido feliciffime adhibebantur.
ıque milites hoc typho laborantes vidi,
um vero extinctorum cadavera diffecavi.
iones cadaverum. Inteftini recti fuperfi-
interna plerumque fqualidi coloris erat;
niverfum autem nihil anomali oftendit. In
is inteftini inprimis ilei fuperficie interna
im concrementa cruftacea ex albido cine-
coloris, maximam partem fubrotunda, in-
um irregulariter ovalia, quadrantem lineae

partem fuper inteftini fuperficiem exta variae magnitudinis modo capitulum adaequantia, modo perfciffum pifum rantia, quorum majorum quidem margi tunicis inteftini diftabant, ita, ut ab iis f viderentur, inveniebantur. Cum haec co menta levi manu ablata effent, foffae c vae, in tunicam muscularem, imo in cell fam ingreffae, quarum fundus ac parietes ves absque pure et ichore, fed coloris tan fubrubri notabantur. Quoad fpeciem ex nam haec concrementa cruftis fingulis, q tinea favofa producuntur, haud diffimilia debantur, digitis autem contrita haud di ria erant tuberculis, quae in pulmonibus, pate vel mefenterio infantium fcrophulofor inveniuntur. Omnium autem ftructura ac lor idem erat. Minora tubercula numqu femper vero majora areola imflammata circu data vidi. Itaque haec concrementa non flammatione locali orta, fed pathologicae pofitiones videntur, quae telam fanam tuni rum fenfim demovendo, irritatione fua infla mationem fecundariam adducunt, qua folvunt et ejiciuntur. Hac quoque ratione margin diftantes majorum tuberculorum, quafi mat rorum, et foffae concavae, quae una cum t berculis in uno eodemque cadavere inveniunt dilucidari queunt. Phthifis pulmonum tube culofa aliquid fimile oftendit. Tuberculofa co crementa adaugentur in pulmonibus, irrita ac ftatum fubinflammatorium faciunt, quo fo vuntur et cum muco ejiciuntur. Quae auter in phthifi pulmonali expectoratio, in typho ab dominali diarrhoea vocatur. Quis autem, qu

intestinorum ad haematosim et reproductio-
nervorumque in iis multitudinem novit
ari potest, hujusmodi affectionibus intestino-
tam graves sequelas ac turbationes functio-
cerebri sympathice adduci? Nonne vidimus
ancholiam, maniam anglicam, furibun-
quoque variis abdominalium viscerum
bis procreatas. Cur non tubercula et qui
favet status intestinorum morbosus via
pathiae cerebrum ac coenaesthesin ita afficere
int, ut aegroti typhomaniaci evadant.
propter natura morbi, mihi quidem, oppor-
tas tuberculosa videtur, ut in phthisi tuber-
sa, signum pathognomicum vero non ul-
, sed tubercula intestinorum tenuium.
lto convenientius igitur hic morbus Ente-
thisis tuberculosa vocandus sit, si ad na-
m morbi veram respiciatur, sin vero si-
m externum, constans plerumque, sed mor-
diversissimis commune, spectetur, Ente-
hthisis typhodes. Complexus sum hic, quae
olini, in caritatis nosocomio, quae Bromber-
et Sedini in nosocomio militari obser-
i.

Dysenteriae.

Exceptis febribus intermittentibus, nullum
d morborum genus milites dysenteriis fre-
ntius infestabat.

Rheumatica vero dysenteria subito homi-
invadebat. Post rigorem brevem cum do-
bus capitis et colicis, trahentibus, pulsus
uens, magnus ac duriusculus, calor et tur-
faciei, intrabant; tenesmi, sedes frequen-

tiſſimae, quibus materiae ſeroſo-cruentae, nunquam biliofae, parce exonerabantur, grotos cruciabant; ciborum appetentia ſitis magna erat.

Febris interdum vespertino tempore exacerbata eſt, ut prima nocte aegroti delir

Prognoſis bona ſtatuenda erat. Octo dem hac dyſenteria laborabant, nullus vero tinctus eſt. Circa quintum vel ſeptimum pulſus retardatione, ſomno recreabili, ſed parcis, minus tenesmoideis, ſed foeculent bus, quibus parcus aut ex toto nullus ſan admixtus erat, morbi decrementum indica tur. Sudores et urina critica rariſſime ob vata ſunt. Curandi methodus ſimpliciſſima, o mo ſucceſſu coronata eſt. Regimen antiphlo ſticum, potus mucilaginoſi, decocta radicis ſa vel mucilagines gummi mimoſi cum guttu decem tincturae thebaicae ſimpl. vel extra aconiti granis quatuor, adhibita ſunt. Mor decreſcente amara adſtringentia vel in decc mucilaginoſ., ſi colici dolores ac pulſus ju frequentior eſſent e. g. Extract. cascarillae I dimid. ad integram in decocto rad. ſalep Un ſex, vel rad. columbo Unc. dimid. cum ra ſalep Dr. dimid. ad colaturam Unc. ſex, prop nata ſunt.

Si nec febris nec dolores reſtarent, ſed di arrhoea, decocti rad. Columbo Unc. ſex e Uncia dimidia parati cum tinctura Pomoru Aurantiorum vel cinnamomi, praeſcriptum. Cum vero morbus poſt ſeptimum diem increſcere cum dolores colici et teneſmi ſine remiſſion aegrotum cruciarent, ſedes frequentiſſimae vi res frangerent, exacerbationes protraherentu

iſſiones autem febris magis magisque eva-
cerent et pro ſomno deliria obſervarentur,
veres e Nuce moſchata cum ipecacuanha et
o parati, externe autem ſinapismi et fomen-
ones aromaticae in regione hypogaſtrica,
uſum vocatae ſunt.

Haec dyſenteria cum febre gaſtrica com-
ata facilius ſtatum putridum adduxit; com-
atio cum intermittente febre ſaepe diar-
eam chronicam et hydropem procreavit.

Dyſenteria catarrhalis.

Mitioribus quidem ſymptomatibus decur-
e ſolebat: pulſus veſpertino tempore fre-
ns et mollis, dolores capitis obtuſi, ſitis
us aucta, dolores colici, ſedes tenesmoi-
e mucoſae paululum cruentae et frequentes.
morbus feliciter ſemper decurrens nullum
remedium, excepto regimine aptv, popo-
Dolores colicos et tenesmos pulv. Do-
i depulit. Quatuor milites hoc morbo
epti et ſanati ſunt.

Dyſenteria gaſtrica.

Hypochondriis tenſis, dolentibus, vomitu
eriei mucoſae e luteo viridis, pulſu fre-
nti, parvo, magna inclinatione ad gangrae-
entiam inteſtinorum craſſorum, diarrhoeam
idam et meteorismum inſignis erat.

Prognoſis peſſima tantum ſtatui poterat,
em enim aegrotabant, quatuor vero morte
mpti ſunt. Generatim anticathartica et mu-
inoſa cum acidis mineralibus optime con-

veniebant. Cum abdomen dolens nullum tactum patiens et tensum esset, hirudines gnum levamen attulerunt. Angorem prae diorum et vomitum, in quibusdam casi ubi linguae radix quidem humida, pu frequens simul autem mollis esset, emeti et sinapismus ad regionem ventriculi app tus, celeriter levarunt: si lingua autem ar pulsus debilis, angor et vomitus, molestiae sensuales et symptomata phlogoseos septi inferioris tractus intestinalis partis essent, g tulae aliquot tincturae opii simpl. cum sp tu sulphurico-aethereo et tinctura valeria simpl. nec minus fomentationes abdomi aromaticae auxilium tulerunt. Haud raro tem diarrhoea colliquativa putrida brevi grotos absumpsit.

Dissectio cadaveris ostendit: inflammat nem et gangraenam tunicae internae intest crassi; intestini recti tunicas incrassatas tanta que sanguinis nigri, putridi accumulatione ut tota interna intestini superficies nigra gangraenosa videretur; et intestinum ten multis sanguine injectis vasibus et exanthem te morbilliformi conspersum; lienis volum auctum.

Dysenteria putrida.

Aut malus exitus gastricae dysenteria aut complicationis cum febre intermitten functionibusque reproductivis, infarctibus v scerum abdominalium turbatis, sequela erat.

Cum pulsus frequentia ac duritie, occip tis dolores obtusi, calor faciei luridus, gen

latericius, nonnunquam purpureus, lingua, a, fciffa, fusca, anxietas praecordiorum, abnen efflatum, tenfum, dolores colici, tenes- alvi exonerationes ichorofae, faepe nigrites, foetidiffimae, quibus flocci vel noduli oidei et trombi nigri infperfi, atque deli- incipientem putredinem indicabant. Febris iffiones evanefcebant, fitis erat infatiabilis sque ita dejectae, ut aegroti e lecto fure propria vi nequirent. Cum ad hunc gran morbus increviffet, nonnunquam fudore verfali, lyfis indicabatur. Cum autem de- ftatui foporofo cederent, pulfus parvus, ilis, frequentiffimus, imo myurus effet, vul- collapfus, oculi latentes, conjunctiva fanne extravafato turbida, extremitates viola- coloris, abdomen collapfum, ecchymofibus fum, fedes involuntariae, tanta anxietas, miferi in lecto fefe circumjicerent et voce miffa auxilia peterent, decubitus fub finem niumque ciborum ac potuum rejectio, vouritiones et vomitus, mortem pronunciat, quae poft longam dimicationem febatur. Omnes aegroti, etiamfi per plures deliraviffent vel foporofi fuiffent, moridi fuae mentis erant.

Prognofis femper peffima; cum enim unim milites aegrotarent quatuor extincti morte. Morbi decrementum fperandum erat fudores univerfales haud copiofos, quod el poft ftillicidium vidi; pulfus pleniores molliores febris remiffiones integrae tunc ervabantur. Nullum autem fignum certius eelerius reconvalefcentiae ftadium pronunat, quam vultus et oculi clari hilaresque.

Lingua humida facta, mox muco expun eſt, ſedes frequentes quidem ſed faeculen erant. Quietus ſomnus maxime aegroto ſiciebat.

Hoc ſtadium ad tres vel quatuor hebdomades protractum eſt.

Ubi ſaburra adeſſet, ſine phlogiſtica c plicatione, primo initio transitus intermitte febris in dyſenteriam bono effectu emeti e pulvere rad. Ipecacuanhae datum eſt. I grediens putredo feliciter acidis mineralib praeſertim acido muriatico, vel aqua oxym riatica, in decoctis mucilaginoſis adhibita, vincebatur. Etiam Clysmatibus aqua oxym riatica bene admixta eſt. Cum dejectio vi um paralyſin minaretur acida mineralia rad. Valerianae vel florum Arnicae infuſis p pinabantur. Alumen crudum tum demum auxilium vocabatur, cum diarrhoea colliqu tiva omnia liquefacere videretur, poſtqua Cascarilla, Simaruba, lignum campechienſe ratanha, fruſtra adhibita eſſent. Ad opiu paene nunquam confugiendum fuit, cum dia rhoeam non ſiſteret, ſed vires raperet, adyn miae et ſomnolentiae faveret, brevi ſtatum pu trido-typhoſum artificialem adduceret. Mi nima doſis hujus medicaminis adhibita in vo mitu, cui ventriculi ſenſibilitas nimia ſuberat nonnunquam levamen attulit. Meteorismum optime fomentationes aromaticae devincebant Reconvaleſcentium vires infuſo corticis Chinae vel decocto leviori cum tincturis aromaticis et vino reficiebantur.

Febres intermittentes.

Cum jam plures per annos intermittentes
res regnaſſent, haud mirum eſſe potuit, quod
febres totum fere exercitum corriperent.
lo victu, domiciliis ſordidis ac humidis,
moratione in frigida modo, modo calida
peſtate ſimulque humida, factum eſt, ut
res aeſtivae in autumnales, hae vero in hie-
es commutarentur. Octingentos in univer-
his febribus laborantes vidi. Nec com-
ationes abfuere. Febres aeſtivae bilioſo-
rica, autumnales pituitoſo-gaſtrica compli-
one eminebant. Hujusmodi febres non-
quam remittentem typum uſurpaverunt, cum
geſtiones et ſubinflammationes hepatis vel
is ortae eſſent, aut bilioſa et pituitoſa
uvie functiones tunicae inteſtinorum inter-
adeo eſſent laeſae, ut inflammationes inte-
orum tractus lentae et clandeſtinae gigne-
tur.

Notabilis quoque harum febrium infanda
recidivos morbos inclinatio fuit, ut paene
ituales fierent et infarctionum viſcerum
ominalium pervicaciſſimarum et dyſcraſiae
ropicae anſam darent.

Prognoſis hujusmodi febrium in univer-
bona, propter complicationes, ad recidi-
febres inclinationem et, quae conſequi ſo-
nt, dyſcraſias, erat dubia.

Curandi rationem pro individualitate ae-
tantium et complicatione febrium eligi
rtebat. In plurimis vero aegrotis aſſidua
eparatoria quam dicunt methodus inſti-
ıda videbatur. Ubi mera gaſtrica com-

plicatio observabatur, emeticum e Ra-
cacuanhae pulvere datum est; tunc am
resolventia e. g. infus. hb. trifolii vel
thii, adhibebantur.

Si febris cum gastrico-pituitoso statu
plicata esset, acida mineralia conveniebant.
lingua tenaci muco tecta, praecordia tensa,
intermissionis tempore pulsus parvus et freq
ipsi paroxysmi irregulares praesertim an
nentes, pro frigore horripilationes ac do
artuum, stadium coloris nimis protractum,
spicerentur, exitantia nervina e. g. rad. v
rianae cum acidis mineralibus propinaban
Quibus remediis complicationes exstinctae
typi regulares redditi. Febris ipsa chinino
phurico, nonnunquam ope acidi sulphurici
aqua soluto, frangebatur. Cum gastrosis
longum tempus omnibus remediis resiste
febris autem vires consumeret et dyscrasias
gneret, ad decoctum cort. Chinae cum A
muriat. dep. parat. confugiebamus.

Febres intermittentes larvatae.

Febrem intermittentem larvatam ter n
tavi: Primo quidem specie pleuritidis spuri
decurrentem. Homo debilis, constitutione er
thico-scrophulosa, subito vehementissimis d
loribus ad cristam ossis ilei deorsum, ad hu
merum sursum vagantibus, situ corporis mu
tato crescentibus, et magna regionis epigastri
cae tensione capitisque gravedine, valde la
boratus. Pulsus durus et tensus, uno mo
mento centies vicies sensus est; lingua muc
albido tecta: respiratio brevis, anhelosa. Pol

rtam horae partem calor, poſt tres horas
or intravit. Cum aegrotus adverſus aëris
flatum, haud procul a ſcala, plures horas
nmoraviſſet, rheumatismus muſcularis accu-
s eſt. Infuſum igitur Florum ſambuci cum
taro ſtibiat. et Liquore ammonii acetici eſt
pinatum. Inſequenti die aegrotus bene
habuit; tertio vero die ſimilis paroxysmus
ervatus eſt. Hujusmodi paroxysmis qua-
r praeterlapſis chinini ſulphurici gr. duo-
im cum Opii gr. uno, tribus vicibus data
:, nec ullus paroxysmus rediit.

Reliqui duo aegroti, viri robuſti, gaſtroſi
orantes, vehementibus marginis exterioris
tis ſupraorbitalis oſſis frontis doloribus pun-
tibus, alternis diebus vexabantur. Pulſum
per magnum, mollem tardumque notavi.
ſtra ſolventia, incitantia, antiſpaſtica et de-
ntia tentata ſunt. Cum igitur dolores certo
o redeuntes obſervarentur, decoct. Cort.
nae cum Extract. belladonnae in uſum vo-
im eſt, quibus remediis morbus feliciter
ſanatus.

Febres gaſtricae.

Gaſtricae autem febres quibus centum et
ginta laborantes notavi, ſaepe male decur-
int. Quarto enim aut quinto die remiſſio-
febris paene evaneſcebant, temperies cutis
a, lingua fuſca, labia cruſta nigricante
a, ſitis ingens, dolores capitis obtuſi, ob-
abantur. Vultus quaſi elongatus anxieta-
et triſtitiam exprimens, virium proſtratio
tanea ac deliria transitum in febrem ga-

ſtrico-nervoſam indicabant. Nonnunqua bris gaſtrica cum dyſenteria compoſita quae breviſſimo tempore adeo vires con bat, ut mors inſtare videretur.

Prognoſis igitur dubia erat, duo enim lites febre nervoſo-gaſtrica mortui ſunt. ra ſolventia, leviora irritantia et acida r ralia optime conveniebant e. g. Hb. tr fibrini vel abſinthii vel menth. piperitae. monium muriat. nonnunquam gaſtricismu ctus et diarrhoea inſecuta ſunt. Emet e mera tantum ipecacuanha adhiberi po cum tartarus ſtibiat. magis alvum duc quum vomitum moveret. Cum gaſtrica fe in nervoſam transitura videretur valeriana calami aromatici radices cum acidis miner bus, et antiſpasmodica in uſum vocata ſ Hunc transitum emeticum quoque, remiſſi tempore ſumptum, ſaepe impedivit.

Dyſcraſia hydropica.

Pleuritis, febris intermittens, dyſenter cholera indica, fontes erant perennes, e q bus haec dyſcraſia emanabat; cujus perti cia aeque inſignis erat, ac praevalentia c ſium abdominalium. Diarrhoea enim profu perfectiorem certioremque numquam hydrop kriſin notavi. Cum alias igitur alvi fluxum ta quam inimicum periculoſum timerem, in h drope gratum nuntium ſalutavi. Sanatio, mo urinae ſecretione et excretione, partim diſ cillima, partim imperfecta et momentanea ta tum erat; remediis igitur diureticis ſepoſit celeriter aqua accummulabatur.

Hydropibus, qui febres intermittentes ſe-
bantur, ex infarctione plerumque hepatis vel
s ortis, bono ſucceſſu rad. ſcillae, ſulphur.
t. extract. belladonnae et calomel mede-
r. Cum ſtatus ſubinflammatorius, herb.
alis purpureae, Calomel. Kali nitric. et
ior tartari, laudanda erant. Hydrops tor-
s non diureticis, ſed potius amaris, hb.
lii, rad. calami, rad. gentianae et cort. chi-
cedebat. Interna remedia infrictionibus
ion. ſapon. terebinth. vel ſpiritus cam-
at. cum oleo terebinth. adjuvabantur.
n ſcarificationibus regionis inguinalis et
i uſi ſumus. A multis quidem ſcarifica-
s repudiatae ſunt, quod inflammationem
pelatoſam efficerent; operatione autem di-
ter inſtituta, haec rariſſime timenda erit.
mum eſt ſtrias marmoreas, ceruleas, ve-
cutaneis feminarum cute alba et tenui
litarum haud diſſimiles, ſero impletas,
in regione inguinali et interno femorum
e conſpiciuntur, lanceola levi manu pun-
ita ut epidermis tantum ſolvatur. Si au-
infeliciter eryſipelas traumaticum ortum
aqua vegeto mineralis Goulardi adhibi-
eſt. — Octoginta tres homines Bromber-
ıydropicos obſervavi, ſex vero mortui ſunt.
Cum poſt choleram aſiaticam hydrops
es ortus omnibus remediis pharmaceuti-
eſiſteret, paracenteſis abdominis inſtituta
eo quidem ſucceſſu, ut aegrotus poſt ſe-
menſes regenerato hydropi succumberet.

Cholera indica.

Tot ſane tantaque clariſſimorum in re me-

dica virorum exſtant de hoc morbo op
ſupervacuum mihi ſit viſum, morbi h
ennarrare vel hypotheſibus de choleras
ac indole novas adjicere. Brevi igitur
vata quaedam referam. Prae caeteris g
aut intermittenti febre laborantes, quun
cerbatio vel paroxysmus expectandus
cholera correptos vidi. Contagioſitatis
inſignia, ac contrarii exempla notavi. Ne
nus deteſtabiles, quam ipſe morbus, erai
quelae. Saepius autem cholera in ty
gaſtrico-patridum abire amabat, quod Se
quoque in terra aſtracana obſervabat, aſſe
hunc metaſchematismum odore ſpecifico
cari. Primo cholerae inpetu ſuperato in
proſtratio virium, pulſus parvus, frequen
diarrhoea remanebant; frigus mortis c
mordaci cedebat; facies livida, oculi late
ſqualido ſanguine tincti, vox rauca, ſubm
ciborum appetentia nulla; ſitis ingens, del
blanda tendinumque ſubſultus. Poſt ſeptim
circiter diem phlogoſis ſeptica inteſtinor
oriebatur. Abdomen impatiens tactus, met
rismo inflatum, calor mordax, pulſus m
rus, lingua fusca, imo nigricans, arida; di
rhoea ichoroſa, ſomnolentia, ſingultus et
tremitates frigidae, ſudores tenaces, colliq
tivae, petechiae et ecchymoſes, ſedes involu
tariae, ingens praecordiorum anxietas, vomit
ritiones, animi deliquia, poſtremo mors.

Tres milites hoc typho necatos, unu
tantum ſanatum vidi. Prognoſis ſemper pe
ſima. Nec incitantia, nec demulcentia, ne
antiphlogiſtica, nec roborantia quidquam v
lebant. Morbo ſpecie typhi nervoſi decurrent

non calor mordax, diarrhoea modica, ab-
en doloribus expers ac pulſus plenior erat,
aliqua ſanandi relicta eſt; nervina cum
s mineralibus non fruſtra adhibebantur.
Sphacelo e cholera orto primas digitorum
m phalanges conſumtas vidi.
Senſibilitatem pedum cholera tantam pro-
am notavi, ne involucra quidem homo et
nenta vel leviſſimum tactum perpeti poſ-
Nudis igitur pedibus in lectulo ſedens,
ma anxietate ac diligentia quisquis pe-
adpropinquaret arcere ſtudebat. Initio
a ex infuſis florum chamomillae adhi-
unt. Cum ſenſibilitas ita obtuſa eſſet, ut
tactum digitorum perpeteretur, infuſ.
e hyoscyam. concentr. cum Extract. bel-
nae et opio infricatum eſt, ſimul deco-
fuſum cort. chinae et rad. angelicae pro-
um quod una cum vino et jusculis vires
ebat, ita ut poſt tres hebdomades homo
alcaneis inſiſtere poſſet.
Vertigo et vomitus periodicus e cholera
us hac ratione ſanata ſunt: ſingulis horis
rae opii ſimpl. guttul. una cum duabus
l. aquae chamomillae dabantur, omni qua-
e horae infuſ. florum chamomillae cochlea
, ciborum aut potus ex toto nihil. Qua
do per quadraginta octo horis continuata
malo permoleſto liberatus eſt.

Rheumatismus.

Coxalgiam rheumaticam ſemel coxarthro-
imitari notavi. Aegrotus dolores regio-
rticulationis femoris ſiniſtri cum trunco

trochanteris majoris et genu accuſavit. ...litas femoris in acetabulo perdifficilis ...lens erat. Femur quadrantem pollicis ...tum; ceteroquin nec tumor nec rubor ...lor dolentis regionis. Aegrotus pede i... et ambulare, auctis quidem doloribus, ... dolores non continui, quin imo per ... horas intermittentes, aliis diebus exac... aliis mitigati, veſpertino autem tempo... hementiores erant. Variis quidem, varii... poribus inſtitutis perveſtigationibus nec l... nec ſubluxatio inveniri poterat.

Quamquam febris et ulcerationis ... abeſſent, prognoſis tamen dubia ſtatui de... cum rheumatismi articulares pertinatiſſim... ſoleant.

Ungt. Hydrarg. ciner. cum tartaro ſti... (Ungt. ciner. ℥ß Tartar. ſtibiat ʒj) region... chanteris majoris infricabatur. Cum aeg... doloribus valde debilitatus eſſet, decoctum ... chinae propinatum eſt. Infricationibus per... tuordecim dies continuatis et ſuppuratione ... acrib. ſuſtentata, aegrotus poſt quinque he... mades ſanatus eſt.

Iſchias nervoſa poſtica, veſicatoriis vo... tibus, ab inciſura iſchiadica majori ad fo... popliteam usque ſenſim applicatis, felic... ſanata eſt.

Tumor albus genu.

Saepiſſime rheumatismus, articulation... genu invadens, tumorem album ſeu ſpong... ſum genu rheumaticum procreabat. Poſt ... gores breves, calorem et ſudorem, dolo...

entes genu obſervabantur. Duobus vel s circiter praeterlapſis diebus genu intu- ebat, calebat at dolebat. Motus, imprimis ɔ genu, dolens erat. Tumor non circum- :us ſenſim defluebat; digiti prementes relinquebant. Patella mobilis nec pro- ; nonnunquam juxta margines patellae ales erat tumor major, gaſtris musculi :. Tumore orto, febris evanescebat. Sem- ſiniſtrum genu hujusmodi rheumatismo :ans vidi, ſi unum excipias caſum, quo dyſenteriam tumorem album genu dextri ſtaticum obſervavi. Aliquando etiam tu- m ſiniſtrum genu relinquere et dextrum lere, ad ſiniſtrum redire, brevi poſt ru- vaneſcere et cum ophthalmia rheumatica nutari, poſtremo autem de integro vagari primam ſedem regredi vidi.

Prognoſis bona ſtatui poterat. Quinque es hoc tumore correptos et ſanatos vidi. omnes aegrotos affectum genu pulvinari ɔ, e ſtuppa confecto, pulvere colophonii ɔerſo et ſpiritu vini humectato, circumda- :. Poſt octavum vel duodecimum diem, ɔre, dolore ac immobilitate diſſipata, pul- articulum ſpatioſe circumdans ſeponeba- Cum aliqua imbecillitas ligamentorum larium relicta eſſet, linimentum ammo- -camphorat. infricatum eſt.

Hydarthrus.

Tumor circumſcriptus, valli inſtar, patel- elevatam circumdabat. Omnes motus, imis flexio, vehementes dolores adduce-

bant, digito premente foſſae non relinq-
tur, ſluctuatio apparens perſentiri potera
Hoc malum grave et periculoſum,
ſemel notavi, fortiter tantum adhibito
tiali cauterio ſanari poterat. Tres igitur
xae, ope Kali cauſtici fuſi, ad utrumque
affectum applicabantur, interne decoct.
propinabatur. Sanatio tarda quidem, ſed
fecta, inſecuta eſt, poſt menſem ſesqui alt
homo reconvalescens, pedibus, ope ba
inſiſtere et ambulare potuit.

Morbi organorum reſpiration inſervientium.

Qualem autem quantamque vim ge
morborum epidemicus et conſtitutio aëri
procreandos morbos exercere ſoleant, rariſſi
febribus inflammatoriis phlogoſibusque i
pathicis ſatis eluxit. Quamquam enim a
militum virilis ac robuſta, vitae ratio atque
gotia, imflamationibus anſam darent, turbatio
functionum viſcerum abdominalium ita prae
lebant, ut omnes fere morbi bilioſo aut pit
toſo gaſtrico charectere inſignes eſſent.

Pneumoniae, vel bronchitides ſubacut
vel pleuropneumoniae erant, quae facili
methodo antiphlogiſticae reſiſtebant et in ſ
tum congeſtionis inflammatoriae, aut ſi ma
irritationis congeſtivae abeuntes, bronchitide
chronicam vel exſudationes ſeroſas gignebar
Pulſus durus ac frequens ſaepe inaequalis, o
preſſio pectoris magna, reſpiratio brevis a
difficilis remanebant.

Prognoſis dubia ſtatuenda erat. Pleur

moniae bis in hydrothoracem et mortem
ınt. Therapia. Syſtema vaſorum arteriale
r nimis irritatum, deprimendum, con-
ɔnes et irritationes pulmonum locales, im-
:ndae ac demulcendae, expectoratio muci
ormis ſecreti levanda, reſorptio exſudatae
adjuvanda videbantur. Quibus indica-
ɔus, repetitis ſanguinis evacuationibus unc.
d octo, remediis vim cordis deprimenti-
et demulcentibus nec minus diureticis:
nelane, refracta doſi, herb. digital. purp.
ct. Hyoſcyami vel lactucae viroſae ſatis-
ɔatur.

Blenorrhoea pulmonum chronica, viri
ti, plethorici, magnis congeſtionibus su-
ta, atque pectoris oppreſſione, ſputis co-
foetidiſſimis inſignis, optimo ſucceſſu
ſectionibus, infus. herb. Digit. purp. et
inem pulvere carb. ligni tiliae cum myr-
eſt ſanata.

Hydrothorax torpidus ex abuſu ſpirituo-
ı potuum cum varicibus vaſorum pulmo-
m et cordis (ut ſectio cadaveris docuit)
elirio trementi complicatus, in mortem
Per multos jam annos aegrotus, robu-
brevi corpore praeditus, dyspnoea ſaepe,
ıla ac haemoptyſi laboraverat; cum in
ıdinarium reciperetur, haecce ſymptomata
notabilia: dyspnoea, praecipue in am-
do et ſcalas aſcendendo, pulſus parvus,
et frequens, oculi turbidi, color faciei
ıs, genae ceruleae, apex naſi, coloris plum-
aſa conjunctiva varicoſa, labia oris pallida,
s anxius et triſtis, lingua muco albido
ciborum appetentia nulla, ſitis aucta,

vomituritiones, oedema pedum dorſiq… nuum. Tremor artuum, vigil aut ſomn… ribilibus interruptus ſomnus, ſaepe … Dolores pungentes in medio pectore … mucoſa haud raro ſanguine ſtriata, tuſſi… et ſpasmoidea ejecta. Urina ſparſa, fus… bida, alvus ſtricta. Percuſſum pectus … reſonabat.

Prognoſis mala tantum eſſè poterat, … morbus e dyscraſia ortus tarde proſer… praeſertim propter complicationem cum … rio trementi.

Reſpectu curationis diverſiſſimis indic… nibus ſatisfaciendum erat; pulvis igitur … cum cremore tartari, ut alvi excretio ex… retur, in uſum vocatus eſt, tunc calomelas … pulv. herb. digital. purp. et opio, infuſ. h… digital. purp. cum tinctura opii ſimpl. et … ritu nitrico-aeth.

Sed mox homo diem ſupremum obii…

Sectio cadaveris oſtendit: pleurae ſac… magna copia humoris viridis repletos, m… tas varices in pulmonibus et ſuperficie cor… pulmones pallidos, collapſos, e quibus inc… ichor purulentus exprimi poterat, hepar ac l… normale volumen exeuntia.

Anginae gaſtrico-catarrhales mitiores, bre… tempore, emeticis et gargarismatibus ex infu… herb. ſalviae ammon. muriat. et oxymel… ſimpl. ſanatae ſunt.

ravaſatio in cavum abdominis ſanguinea.

N. N. Triginta annorum, temperamenti
ɔrico-ſanguinei et conſtitutionis corporis
ıe et robuſtae, cum equos paſceret un-
fortiſſimi equi agminalis adeo ictus eſt
ſiniſtrum dorſi latus, ut mente privatus
et. Pluribus horis praeterlapſis, a com-
onibus repertus, ſtramento impoſitus eſt.
miſer diem ſupremum obiturus videretur,
nilitones non auſi ſunt aegrotum vel ad
udinarium Brombergenſe, miliarium cir-
remotum, curru transvehi. Poſt horas
n triginta ſex, cum anima nondum effu-
, plauſtro frumentario Brombergam ad-
s eſt. — Aegroti facies erat collapſa et
la, coloris cerei, frons, extremitates et
gaſtrica regio frigidae, praecordia vero
a. Reſpiratio tarda, brevis, difficilis;
s cordis vix percipi poterat. Pulſus ob-
s, parvus, frequens, facile comprimendus.
men erat tenſum efflatumque, fluctuatio
ſentiri poterat. Hypochondriaca regione
ɔſſa ſiniſtra, aegrotus motu vultus convul-
ıc leni gemitu dolorem indicabat.

Dorſi inveſtigatio tumorem, ad ſuperio-
vertebrarum lumborum latus ſiniſtrum,
um, longitudinis ſeptem, latitudinis vero
ue pollicum. Hic tumor, unius pollicis
er altitudinis, minus clare circumſcriptus
nec coloris, nec temperiei annomalae, atta-
ttactu dolens. Coſtae ſpuriae, quaqua per-
ri poſſent, incolumes videbantur. Lin-
ɔfrigerata, muco albo tecta ejusque mar-

gines pallidi erant. Excretiones urinae
insequenti quidem die, normales observa
Extravasatum abdominis cavitates
tem satis manifesto extensio et fluctuat
bant. Cujusnam generis extravasatus
esset, e celeritate, qua mechanica vi a
ortus, e magna copia contenti, e colla
talitate ac sensibilitate, e motu cordis
riarumque pulsatione vix sensibili aliis
gnis, quae organismum exsanguem o
bant, satis elucebat.

Exsudatio serosa, nec cum causa effi
nec cum originis celeritate erat congr
E causis anatomicis et physiologicis, c
felleam et vasa lymphatica rupta, ex
tum effecisse, negari poterat.

Extravasatum igitur sanguineum era
noscendum.

Organum, quod sanguinem emiserat,
humore abundare debebat; lobulus autem
patis sinister, partim nimis antrorsum po
partim firmioris structurae est, quapropter
ficulter vi à tergo commoventi adeo vulne
potuisset, ut intra paucas horas tanta ex
vasatio consequeretur.

Laesionis renis sinistri symptomata ex t
aberant, splenis igitur laesio accusanda era
Cujusmodi autem laesio fuerit, ex his f
san elucebit. Rupturam splenis substant
majorem experientia repudiabat, laetales
docens; idem de arteriis splenicis contendi
terat, quo accedebat, quod arteriae difficili
vi commotoria rumperentur. Vis deniq
quae venas splenicas in continuitate vulnerav
set, a parietibus abdominis cavi remotas, sp

ſuo curſu et laxitate ictum declinaturas,
ipſum potius laeſiſſet. Paralyſis autem haec
nagna, ſanguinem emittere, rariſſime coget.
agata vero vi commoventi ſplenis paren-
ia ita commotum, ut paralytico vasculorum
lorum ſtatu, ſanguinis ortam eſſe extravaſa-
m crediderim. Quod etiam cum aucto ſple-
olumine, ſanguine reſorpto, conſentit.
raro nobis hujusmodi ſanguinis extra-
ones occurrunt, cum alia organa, quibus
vaſa ſanguinem ducentia intexta, ut cere-
et pulmones, commoventur. Verum enim-
ſplen ſua ſtructura tenera, vasculorum in-
rabilium ramificationibus, ſpongiae ſan-
impletae haud diſſimile, involventis mem-
e teneritate, ad extravaſationes commotioni-
ffectas, eſſe aptiſſimum, quis negaverit?
Prognoſis erat peſſima; primum, quod im-
fuerat vehementiſſimus, tum propter mul-
xtravaſatum ſanguinem; poſtremo longum,
m morbus duraverat, tempus fuit reſpicien-
Aliquatantum ſpes hauriri poterat e robuſta
s conſtitutione et ex eo, quod poſt viginti
or horas malum non increviſſet. Copia
anguinis extravaſati non augebatur, partim,
ion ſpatium reſtabat, quo influere poſſet;
aſatus igitur ſanguis impedimento erat ex-
anti; partim quia exhauſtus organismus
nem adpellendi vi carebat. Nihilomi-
tem omni momento, ne vita effugeret, ti-
m erat. Itaque vitalis indicationis reſpectu
i omni quadrante horae guttulae viginti
s ſulphurico-aeth. et tinctur. valerian.
ana, inſtillatae ſunt et fomentationes
ticae abdomini impoſitae. Ante mediam

noctem ſtatus fere idem manebat, ſub
tinum tempus, pulſus plenior ſimul et fre
tior ſentiebatur. Aegrotus nunc inquietus
perceptionem quamdam oſtendebat et disc
in quo verſatus erat, noscere videbatur; i
mis reſpirandi difficultatem, ſitim atque d
in ſiniſtra hypochondriaca regione ad dorſu
que vergentes, accuſabat. Abdominis calor r
Alvi et urinae excretio nunc proſecuta, nih
ſoliti prodidit. Tumor dorſi vehementer do
coloris erat e ceruleo rubri. Hirudines duod
ad regionem hypochondriacam ſiniſtram ap
tae ſunt. Sedato ſanguinis effluvio, unguent.
curiale cinereum in abdomen illitum; fom
continuata ſunt. Omni bihorio Calomelanos
num unum datum eſt. Temperatura corporis
normam transiebat. Pulſus non frequens ſol
ſed durus quoque. Applicatio hirudinum re
rata eſt. Tertio die diarrhoea modica mate
fuscae, ſed cui ſanguinis nihil admixtum e
intravit. Abdomen extenſum ſenſim collabeba
dolores aberant, tumor dorſi evaneſcebat, loc
tantum decolorem relinquens. Praeterlapſis qu
que diebus ſumptisque calomelanos gr. trigin
Ptyalismi prodromi obſervati ſunt, qui medio
erumpebat. Calomelane ſepoſito, gargarismata
herb. ſalviae infuſ. cum oxymell. ſimpl. exhib
bantur. Diarrhoea ac ptyalismo exſudati ſuſte
tata reſorptione reconvalescentia celeriter pr
greſſa eſt. Poſt diem octavum ſine auxilio aegr
tus e lecto ſurrexit, ut alvum exoneraret. F
menta jam ſepoſita ſunt, cum abdomen ex to
collapſum eſſet. In ſiniſtra regione hypogaſtri
tumor, tactu dolens, digitis perſentiri potera
Aegroto appetentia ciborum cruciato, magis n

tia dabantur. Ceterum homo omnibus reme-
'epositis, quietum se habere jussus est. Quin-
haebdomadibus praeteritis miles, e valetu-
rio dimissus, iter triginta miliarium fecit
ulla molestia.

Priusquam autem finiam hocce opusculum,
possum, quin psychici quoque morbi hi-
ım addam.

I. W. homo triginta unius annorum, scro-
osa diathesi, sartor, de cujus vita nihil
, quam ante aliquot hebdomades Cholera
a eum laborasse, relatum est, in nostrum
udinarium ab exercitu remittebatur. To-
corpus emaceratum, facies pallida, oculi
i, pulsus durus ac justo frequentior et par-
fuere. Antequam aegrotus in valetudina-
transmitteretur, commilitonem gladio pu-
rat et se effrenatissimum gesserat. In vale-
ario simili modo se gerebat, circumstan-
dlidebat et adspuebat, clamabat; deum
uxilium vocabat, precabatur, cantabat
spiritualia, modo obscoena carmina,
alios devovebat et se miserrimum accu-
improbum. Cum lecto accumbere nol-
sed effugere tentaret custodiamque, quae
tis inserviebat, insultaret, tunica coactoria
us est, tunc hirudines quindecim ad fron-
et tempora applicatae sunt, quod magnae
estiones ad caput observabantur, et infus.
Chamomill., in quo tart. stibiat. gr. sex so-
erant, propinatum. Cum post quadraginta
horas alvi exoneratio non observaretur,
sulphurici ℥j in aq. comm. ℥iij solut. data
qua semel alvus ducebatur. Mox quoque
licatio magni momenti detecta est, hominem

enim manustuprationibus deditum notav
vitium ex eodem fonte ac mania effluere v
tur, e morbo cerebri Cholera effecto, que
ningitidem ſubacutam accuſaverim. De
mentiſſimis, periodice, ſub Veſperam, in
bus capitis doloribus aegrotus conqueſtus e
tempore etiam febris exacerbatio obſerva
Optimo igitur ſucceſſu ſuperfuſiones, aquae
diſſimae ſitulae ſedecim e loco elato omni
pere in caput miſeri noſtri praecipitatae
Interne autem pulveres e camphora cum ka
trico adhibuimus, ut ſyſtema ſexuale nimis
tatum reprimeretur. Balnea frigida quies p
um horarum et ſudores largi ſequebantur. A
laxa, ſimulatque opus eſſet, Natro ſulphurico
ceſſebatur. Hacce methodo, quatuordecem
bus continuata, aegroti ſtatus adeo in melius m
tus eſt, ut nec cuſtodiis, nec tunica coactoria o
eſſent. Cum vir reconvaleſcens ſceleſtum quo
manustuprationis vitium abjeciſſet, pulve
e camphora ſepoſiti, et nutrientia et roborantia
uſum vocata ſunt.

V I T A.

Leopoldus Carolus Rofe, anno MDCCCVI,
liem XVI Calend. Januarias Sufati, Gueftphaliae
), natus patre Carolo Rofe, Archigymnafii ur-
triae praeceptore fuperiore et fubrectore, matre
thea e gente Stein, quam praematura morte
m, quam maxime lugeo, religioni chriftiano-evan-
, fecundum Lutheri formulam addictum fum.
literarum elementis privatim eruditus fum.
n vero agens octavum Archigymnafio traditus, per
m annos literarum difciplinis incubui. Teftimonio
tatis inftructus, anno hujus feculi XXVII, menfe
civibus feminarii medico-chirurgici Friderico-
lmiani regii, quod Berolini floret, adfcriptus, per
ennium hos viros doctiffimos ac illuftriffimos diffe-
audivi:

logice et pfychologia, Ill. Wolff.
otanice, hiftoria naturali et toxicologia, Ill. Link.
phyfice et chemia, tam theoretica quam experi-
nentali, Praecl. Turte.
pharmacia, Ill. Hermbftaedt.
zoologia, Praecl. Lichtenftein.
ofteologia, fyndesmologia et fplanchnologia, Ill.
Knape.
natomia c. h. univerfali, de anatomia organorum
enfuum et foetus humani, nec minus de phyfiolo-
ia et de entozois, Illuftr. Rudolphi.
m cadavera rite diffecandi me docuerunt Ill. Ru-
lolphi, Ill. Knape et Praecl. Schlemm.
phyfiologia quoque differentes audivi, Praeclar.
culz et Praeclar. Eck.
athologia generali, Ill. F. Hufeland.
athologia fpeciali, de morbis pfychicis et fyphi-
ticis, Ill. Horn.
miotice, de therapia generali et fpeciali, Ill. F. Hu-
eland.

De materia medica et de fontibus medicatis,
Osann.

Artem formulas medicas concinnandi me do
Knape.

Praelectionibus quoque interfui:

De chirurgia speciali, Ill. Rust.

De chirurgia generali, de ossibus fractis et lu
de akiurgia, nec minus de arte obstetricia,
Kluge. Idem me docuit: fascias rite app
artem, atque dux fuit operationum chirurg
in cadaveribus institutarum, artisque obst
practicae.

Ophthalmiatricen Praeclar. Jüngken doc
audivi.

De medicina forensi praelectionibus interfui,
Casper.

Celsi libros de medicina mihi exposuit Ill. He

In policlinico et clinico medico mihi duces fu
Ill. W. Hufeland, Ill. Bartels et Ill. W

In policlinico et clinico chicurgico et ophthalmia
Ill. a Graefe, Ill. Rust et Praecl. Jüngk

Quos viros doctissimos et illustrissimos pio gra
animo semper venerabor.

His studiis peractis, per decem menses chirurgi
nere in caritatis nosocomio Berolinensi functus
Subito autem mense Septembri celerrime Brombe
me conferre jussus sum, ut chirurgi valetudinari
strensis munere fungerer. Philosophico medico t
mine tantum superato Berolinum reliqui. Mense De
bri Stettinum me contuli, valetudinario castrensi sul
legioni secundae regiae militum pedestrium adscrip

Tentamine jam philosophico ac medico, nec m
examine rigoroso feliciter superatis, spero, fore, ut su
medicinae et chirurgiae honores in me conferantur,
sertatione thesibusque publice defensis.

THESES DEFENDENDAE.

I.

ricarditidis et carditidis nullum symptoma diasticum notum est.

II.

Maniam methodo, quae dicitur, psychica, re velle, vanum est.

III.

Dactylomyleusis phalangum amputationi praenda est.

IV.

Torsio arteriarum ligaturae praeferenda est.

V.

Sanguini vitam propriam inesse haud negandum.

VI.

Applicatio forcipis omnibus remediis ad paraccelerandam laudatis, praeferenda.